

Sommaire des mesures à appliquer pour un cas suspect de Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) en clinique externe

Ces mesures seront ajustées selon l'évolution de la situation épidémiologique et l'évolution des connaissances sur la transmissibilité du SARS-CoV-2.

Il est recommandé de planifier l'arrivée des patients non hospitalisés de manière à prévenir un achalandage trop important dans les salles d'attente.

Renforcer l'application des pratiques de base pour tous les patients. Porter une attention particulière à l'hygiène des mains, l'hygiène et l'étiquette respiratoire (affichette CHUM disponible).

En raison d'une transmission communautaire soutenue, le personnel ayant un contact à moins de 2 mètres avec un patient doit porter un masque de procédure peu importe le motif pour lequel le patient consulte.

* Il s'agit d'un canevas de base sur les principales mesures de PCI, nous invitons les cliniques à l'adapter

Le personnel de la clinique contacte le patient 24 heures avant la visite et vérifie si celui-ci présente de la fièvre, de la toux, une dyspnée, un mal de gorge, une perte subite de l'odorat.

Selon la réponse du patient :

Non : Confirmer le rendez-vous

Oui : Évaluation du risque par une infirmière pour l'orientation du patient (Urgence ou 811 pour clinique de dépistage)

Borne d'enregistrement électronique (pour pavillon C)	<ul style="list-style-type: none"> • Pose à nouveau aux patients la question suivante : « Avez-vous de la fièvre ou de la toux? ». • Le patient est dirigé vers l'accueil en cas de réponse affirmative.
Accueil (Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre le patient et le personnel de l'accueil ou avoir une barrière physique (ex : plexiglass). Si cela est impossible port de l'EPI gouttelettes-contact.	Personnel : <ul style="list-style-type: none"> • Pose aux patients la question suivante : « Avez-vous de la fièvre, de la toux, une dyspnée, un mal de gorge, une perte subite de l'odorat ». • Avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada dans le dernier mois? Si répond par l'affirmative à l'une des deux questions : Patient : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène des mains + port d'un masque ordinaire (si non déjà fait). • S'assoit dans la zone désignée.
Évaluation médicale et précautions additionnelles	Équipement de protection individuel à revêtir avant l'entrée et retirer avant de sortir de la chambre Gouttelettes et contact + (Affiche jaune avec contour mauve) Personnel : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique, blouse, masque de procédure, gants longs en nitrile, visière. • Idéalement maintenir une distance sécuritaire de deux mètres lors

Sommaire des mesures à appliquer pour un cas suspect de Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) en clinique externe

<p>Évaluation médicale et précautions additionnelles (suite)</p>	<p>du questionnaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délai d'attente non nécessaire avant de recevoir un autre patient <p>Patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène des mains + port d'un masque ordinaire (si non déjà fait). <p>Référence selon l'état et l'évaluation clinique (à déterminer).</p>
<p>Matériel et équipement de base réservé à l'usage exclusif du patient</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter la quantité de matériel qui entre dans la pièce. • Tout le matériel et l'équipement utilisés pour le patient ou touchés par les mains des travailleurs de la santé doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide de lingettes de peroxyde avant d'être utilisés pour un autre patient.
<p>Réalisation de procédures générant des aérosols</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si votre clinique réalise des techniques générant des aérosols vous référez au document pour les soins aigus.
<p>Nettoyage et désinfection de l'environnement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec le patient (ou les mains du travailleur), à l'aide de lingettes de peroxyde d'hydrogène. • En fin de journée : Se référer à l'offre de service d'hygiène salubrité
<p>Retour à la maison</p>	<p>Si le patient remplit l'ensemble des critères et qu'un test est demandé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remettre au patient les directives de la santé publique. • Mentionner au patient qu'il ne doit pas prendre de transport en commun. • Le patient doit procéder à l'hygiène des mains et garder son masque jusqu'à son retour à domicile.